

Spécialités concernées	Formes	Prescription limitée à
Morphine injectable 10, 20, 50, 100*, 200*, 250*, 400*, 500** mg * Laboratoire Aguetant ** Laboratoire Lavoisier	Amp. injectables administrées sans système actif par perf. : Avec syst. Actif	7 jours 28 jours
Morphine solution buvable ORAMORPH en solution buvable unidose de 10 mg/5 ml, 30 mg/5 ml, 100 mg/5 ml ou solution buvable 20 mg/1 ml en flacon compte goutte de 20 ml en flacon préparé en officine	Ampoules et solutés buvables	28 jours
Morphine sirop 5 mg/ml fl. 30 ml Laboratoire Aguetant		
Sulfate de morphine SEVREDOL® cp. sécable 10, 20 mg ACTISKENAN® gél. 5, 10, 20, 30 mg	Forme orale LI	28 jours
MOSCONTIN® cp. LP 10, 30, 60, 100, 200 mg SKENAN® gél. LP 10, 30, 60, 100, 200 mg	Forme orale LP/12 h	28 jours
Chlorhydrate d'hydromorphone SOPHIDONE® gél. LP 4, 8, 16, 24 mg	Forme orale LP/12 h	28 jours
Chlorhydrate d'oxycodone OXYCONTIN® cp LP 5, 10, 20, 40, 80, 120 mg	Forme orale LP/12 h	28 jours
OXYNORM® gél. 5, 10, 20 mg OXYNORM® 10 mg/ml sol inj en amp de 1ml, 2ml et 20ml 50 mg/ml sol inj en amp de 1ml, OXYNORM ORO® cp orodispersible LI (5, 10, 20 mg)	Forme orale : Forme inj. LI Amp. injectables administrées sans système actif par perf. Avec syst. actif	28 jours 7 jours 28 jours
Fentanyl DUROGESIC® patch et nombreux génériques ex : FENTANYL® Ratiopharm patch FENTANYL® Sandoz patch FENTANYL® Winthrop patch MATRIFEN® patch 12, 25, 50, 75, 100 µg/h	Dispositif transdermique	28 jours mais délivrance fractionnée en 2 fois (pour 14 jours)
ACTIQ® cp (citrate de Fentanyl) 200, 400, 600, 800, 1 200, 1 600 µg avec dispositif pour application buccale	Dispositif transmuqueux	28 jours mais délivrance fractionnée limitée à 7 jours
ABSTRAL® cp sublingual 100, 200, 300, 400, 600, 800 µg		
EFFENTORA® cp gingival 100, 200, 400, 600, 800 µg		
INSTANYL® sol nasale 50,100 ou 200 µg /dose, flacon de 10 doses	Solution pour pulvérisation nasale	28 jours mais délivrance fractionnée limitée à 7 jours

TABLE PRATIQUE D'ÉQUIANALGÉSIE DES MORPHINIQUES FORTS

DANS LA DOULEUR CANCÉREUSE PAR EXCÈS DE NOCICEPTION CHEZ L'ADULTE

Validée par la commission régionale
"Traitement de la Douleur"
le 19/03/2010

CONTACTS

► Consultation anti-douleur

► Pharmacie

TABLE PRATIQUE D'EQUIANALGESIE DES MORPHINIQUES FORTS

DANS LA DOULEUR CANCÉREUSE PAR EXCÈS DE NOCICEPTION CHEZ L'ADULTE

Morphine 1 mg PO = 1/2 mg SC = 1/3 mg IV

Soit : 60 mg de morphine per os sont équivalents à 30 mg de morphine par voie SC ou à 20 mg de morphine par voie IV

- 60 mg de morphine per os sont équivalents à 30 mg d'oxycodone per os ou 8 mg d'hydromorphine per os ou 25 µg/h de fentanyl transdermique

MORPHINE (en milligrammes)									OXYCODONE (en milligrammes)						HYDROMORPHONE (en milligrammes)			FENTANYL (en µg/h)			
Morphine Orale			Morphine Sous-cutanée			Morphine Intraveineuse			Oxycodone Orale			Oxycodone Sous-cutanée Intraveineuse			Hydromorphone Orale			Fentanyl transdermique		Fentanyl autres	
Dose par 24 h		Dose du bolus ou interdose* de morphine orale rapide (LI)	Dose		Dose du bolus ou interdose* de morphine rapide SC Δ		Dose		Dose par 24 h		Dose du bolus ou interdose* d'Oxycodone orale rapide		Dose		Dose du bolus ou interdose* d'Oxycodone orale rapide		Dose par 24 h		Dose pour 72 h	Dose du bolus	
MOSCONTIN® cp LP (10, 30, 60, 100, 200 mg)		ACTISKENAN® géf. (5, 10, 20, 30 mg)	Dose par 24 h		Ampoule (1, 10, 20, 50, 100, 200, 400, 500 mg)		Dose par 24 h		OXYCONTIN® cp LP (5,10, 20, 40, 80,120 mg)			OXYNORM® géf. LI (5, 10, 20 mg)		Dose par 24 h		OXYNORM® ampoule (10, 20, 50, 200 mg)		SOPHIDONE® géf.LP (4, 8, 16, 24 mg)		DUROGESIC® patch et nombreux génériques de FENTANYL patch MATRIFEN® patch (12, 25, 50, 75, 100 µg/h)	ABSTRAL® cp sublingual (100, 200, 300, 400, 600, 800 µg)
		SEVREDOL® cp (10, 20 mg)																			
SKENAN® géf. LP (10, 30, 60, 100, 200 mg)									détails des prises							détails des prises			détails des prises		
																					1/10
30		3	5	15	1,5	2,5	10	1	1,5	15	1,5	2,5	10	1	1,5	4		12			
60		6	10	30	3	5	20	2	3	30	3	5	20	2	3	8	4 x 2	25			
120		12	20	60	6	10	40	4	7	60	6	10	40	4	7	16	8 x 2	50			
180		18	30	90	9	15	60	6	10	90	6	10	60	6	10	24	(8 + 4) x 2	75			
240		24	40	120	1/24		80	1/24		120	12	20	80	8	13	32	16 x 2	100			
300		30	50	150	6,25	100	4,2	150			100	10	17	40	(16 + 4) x 2	125	(100 + 25)		augmentation de la posologie, si nécessaire, jusqu'à l'obtention de la dose procurant une antalgie efficace avec une seule unité par ADP.		
360		36	60	180	7,5	120	5	180	(80 + 10) x 2	18	30	120	12	20	48	24 x 2	150	(100 + 50)			
480		48	80	240	10	160	6,7	240	(80 + 40) x 2	24	40	160	16	27	64	(16 + 16) x 2	200	(100 + 100)			
540		54	90	270	11,25	180	7,5	270			180	18	30	72	(24 + 8 + 4) x 2	225	(100 x 2) + 25				
600		60	100	300	12,5	200	8,3	300	(80 + 40 + 20 + 10) x 2	30	50	200	20	33	80	(24 + 16) x 2	250	(100 x 2) + 50			
720		72	120	360	15	240	10	360	(80 + 80 + 20) x 2			240	24	40	96	(24 + 24) x 2	300	(100 x 3)			
900		90	150	450	18,75	300	12,5	450			300	30	50	120	(24 + 24 + 8 + 4) x 2	375	(100 x 3) + 75				

* Dose du bolus ou interdose = 1/6^{ème} à 1/10^{ème} de la dose totale par 24 heures par la même voie

LP = Libération Prolongée = 12 h

LI = Libération Immédiate = 4 h

Δ Dose du bolus ou interdose = 1/24 de la dose totale des 24 h pour les posologies > 120 mg/24 h en SC ou 80 mg/24 h en IV